

SYNOPSIS

TITRE	ETUDE RETROSPECTIVE DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PORTEURS DE CARCINOME BRONCHO-PULMONAIRE EN SERVICE DE REANIMATION
PROMOTEUR	Groupe Français de Pneumo-Cancérologie
INVESTIGATEUR PRINCIPAL	Dr Pierre Bombaron Service de pneumologie, Centre Hospitalier de Mulhouse 20 rue Dr Laennec 68100 Mulhouse Tel : 03 89 64 73 96 Fax : 03 89 64 73 77
TYPE D'ETUDE	Etude RETROSPECTIVE, nationale, multicentrique, sans bénéfice individuel direct
NOMBRE DE PATIENTS	Inconnu
OBJECTIFS	Principaux: Evaluer les conditions de prise en charge des patients atteints de cancer broncho-pulmonaire dans les unités de réanimation dans les centres hospitaliers français durant l'année 2009, afin d'établir une photographie des pratiques dans les différents centres du GFPC. Secondaires : Evaluation de la survie à 1mois, 3 mois et 6 mois
CRITERES D'INCLUSION	Tous les patients du centre investigateur, porteurs d'un carcinome bronchique évolutif, admis en service de réanimation, quel que soit le stade de sa maladie pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2009. L'exhaustivité sera garantie par le DIM du centre investigateur.
CRITERES DE NON INCLUSION	Patient admis dans un service de réanimation dans les suites de la chirurgie de résection pulmonaire pour cancer.
DONNEES	Age, sexe, PS Temps depuis le diagnostic Histologie Stade de la maladie à l'admission en réanimation Cause de l'admission Type de prise en charge en réanimation Traitement anticancéreux avant, pendant et après le séjour en réa ? Taux de survie
DUREE	Du 01/01/2009 au 31/12/2009 (données PMSI ?)
EVALUATION	Détermination d'un taux de survie à 1 mois, 3 mois et 6 mois Evaluation d'un taux de patients réanimés /nombres de cancer du poumon /centre/an

METHODOLOGIE STATISTIQUE	Les données recueillies seront d'abord décrites : • Moyenne, écart-type, médiane et quartiles pour les variables quantitatives • Effectif et pourcentage pour les variables qualitatives Des comparaisons pourront être réalisées au moyen de tests paramétriques et non paramétriques : • Test Chi-2, test de Student ou test de Mann-Witney si 2 groupes • ANOVA, test de Kruskal-Wallis ou test Chi-2 si plus de 2 groupes. Des régressions logistiques pourront être réalisées pour rechercher les variables ayant un caractère prédictif. La survie est définie comme le délai entre la date d'entrée en réanimation et le décès. Les taux de survie à 1 mois, 3mois et 6 mois seront calculés par la méthode de Kaplan-Meier et présentés avec leur intervalle de confiance à 95%.
CALENDRIER	• Passage devant le comité d'éthique de Saint-Etienne : 18/11/2010 • Recensement des cas dans les centres intéressés : janvier 2011 • Remplissage des fiches de saisies : 1^{er} trimestre 2011 • Traitements des données : 2^{ème} trimestre 2011